



## SINTOMAS PSICÓTICOS: ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS FRENTE AOS QUADROS PSICÓTICOS

## PSYCHO SYMPTOMS: PROFESSIONAL ACTIVITIES TO PSYCHO FRAMEWORKS

Andreza Kelly de Assis Alexandre<sup>1</sup>; Ilyandra Rita de Sousa Oliveira<sup>2</sup>; Anúbes Pereira de castro<sup>3</sup>

**Resumo:** Objetivou-se com esse estudo descrever e analisar a atuação do profissional da saúde em relação a pacientes que apresentam algum tipo de quadro psicótico, psicose (que é uma desordem psíquica que não diz respeito ao âmbito da personalidade) e existem inúmeros tipos de psicose ou transtornos psicóticos, como a esquizofrenia, epiléticos ou psicose maníaco depressivo são alguns exemplos de psicopatias mais conhecidas que existem, pesquisa coordenada por Paulo Rossi Menezes professor do departamento medicina (FM-USP) mostrou que os primeiros episódios de transtornos psicóticos ocorrem entre homens e mulheres com idade média de 30 anos e que varia muito entre grandes centros urbanos e regiões mais rurais, sendo que transtornos psicóticos são responsáveis por uma proporção significativa de carga global de doenças, em razão da incapacitação que causam. tem ainda evolução bastante variada e podem levar a graus elevados de impossibilidade. “grande parte dos pacientes requer cuidados especializados em centros de psiquiatria e saúde mental”, disse Menezes. Somado a isso será feito um maior detalhamento dos tipos de transtornos psicóticos, como também identificar os principais cuidados primários a exemplos terapêuticos, assistência até a medicação. Sendo o instrumento utilizado para construção do artigo o site científico eletrônico SCIELO e outros sites da internet.

**Palavras-chave:** psicóticos, cuidados, transtornos e profissional.

**Abstract:** The objective of this study was to describe and analyze the performance of health professionals in relation to patients who present some kind of psychotic condition, psychosis (which is a psychic disorder that does not concern the scope of personality) and there are numerous types of Psychosis or psychotic disorders such as schizophrenia, epilepsy or manic depressive psychosis are some of the best known psychopathies that exist, research coordinated by Paulo Rossi Menezes professor of the department of medicine (FM-USP) showed that the first episodes of psychotic disorders occur among men. and women with an average age of 30 years, which varies greatly between large urban centers and more rural regions, with psychotic disorders accounting for a significant proportion of the overall burden of disease due to the disability they cause. It still has quite varied evolution and can lead to high degrees of impossibility. "Most patients require specialized care in psychiatry and mental health centers," said

<sup>1</sup>Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande-UFCG- Cajazeiras-PB;

<sup>2</sup>Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande-UFCG- Cajazeiras-PB;

<sup>3</sup>Enfermeira Doutora em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública – FIOCRUZ, Docente do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Campina Grande-UFCG-Cajazeiras-PB.



Menezes. Added to this will be further details of the types of psychotic disorders, as well as identifying the main primary care to therapeutic examples, assistance to medication. Being the instrument used to construct the article the electronic scientific site SCIELO and other internet sites.

**Keywords:** psychotic, care, disorders and professional.

<sup>1</sup>Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande-UFCG- Cajazeiras-PB;

<sup>2</sup>Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande-UFCG- Cajazeiras-PB;

<sup>3</sup>Enfermeira Doutora em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública – FIOCRUZ, Docente do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Campina Grande-UFCG-Cajazeiras-PB.